



Röntgenonderzoek van de blaas met contrastvloeistof

Cystografie, met of zonder mictie

U bent onlangs met klachten bij de uroloog geweest. Om meer over de oorzaak van uw klachten te weten te komen, wordt een serie röntgenfoto's van de blaas gemaakt. Zowel voor, tijdens als na het plassen.

Tijdens het onderzoek loopt via een dun slangetje (katheter) in de plasbuis contrastvloeistof in de blaas. Door de contrastvloeistof wordt de blaas zichtbaar op röntgenfoto's. Als de blaas voldoende is gevuld, wordt de katheter verwijderd. Als u daarna plast, wordt de plasbuis zichtbaar.

Een eventuele vernauwing in de plasbuis wordt zo snel opgemerkt. Ook is goed te zien of de blaas volledig leeg is na het plassen. Daarnaast kijkt de arts of er contrastvloeistof terugstroomt van de blaas naar de nieren (reflux).

Het onderzoek vindt plaats op het interventiecentrum Urologie en duurt ongeveer 20 minuten.

Zwangerschap

In verband met de röntgenstraling is het belangrijk te weten of u zwanger bent.

Als u vermoedt of zeker weet dat u zwanger bent, neem dan contact op met de uroloog.

Deze overlegt met u of het onderzoek kan worden uitgesteld.

Vorbereiding

Als u kenmerken van een urineweginfectie heeft zoals troebele urine, koorts of pijn bij het plassen, vragen wij u dit zo snel mogelijk door te geven aan de secretaresse. Het onderzoek kan namelijk niet doorgaan als u een urineweginfectie heeft.

Voor vrouwen geldt dat het onderzoek ook tijdens de menstruatie kan doorgaan. Wanneer u een tampon gebruikt, zal deze meestal kunnen blijven zitten.

Verloop van het onderzoek

U gaat naar een kleedkamer waar u de kleding van het onder lichaam uittrekt. Daarna gaat u op de röntgentafel liggen. De verpleegkundige reinigt bij mannen de penis en bij vrouwen de uitgang van de plasbuis. Vervolgens wordt er een gel in de plasbuis aangebracht. Dit kan een branderig gevoel geven. De gel verdooft het slijmvlies en dient als glijmiddel om de katheter in te brengen. Het is belangrijk dat u probeert zich te ontspannen. Dan geeft het inbrengen van de katheter u zo weinig mogelijk ongemak.

Via de katheter loopt er contrastvloeistof in de blaas. U kunt aandrang krijgen om te plassen.

Geef het aan wanneer de aandrang te groot wordt of wanneer u pijn krijgt. Dan laat de verpleegkundige indien nodig de vloeistof via de katheter aflopen.

Soms vragen wij u om te plassen tijdens het onderzoek. Dit kan in een urinaal of op het toilet..

Daarna wordt er eventueel nog een foto of een echo van de blaas gemaakt om te kijken of u goed leeg heeft geplast.

Soms wordt dit onderzoek met u afgesproken terwijl u een al katheter heeft. Mogelijk heeft u een operatie aan de urinewegen of prostaat ondergaan. Via de katheter loopt de contrastvloeistof in de blaas. Zo kan de uroloog op de foto's zien of het operatiegebied goed is genezen. Als dat zo is, wordt de katheter verwijderd. Zo niet, dan wordt het onderzoek na enkele weken herhaald.

Na het onderzoek

U krijgt van de arts direct de uitslag van het onderzoek. Wanneer u langere tijd een katheter heeft gehad, krijgt u een recept voor een antibioticumkuur mee. Daarna kunt u naar huis gaan. Gebruik van auto, openbaar vervoer of fiets is geen probleem. U kunt thuis uw dagelijkse activiteiten weer hervatten.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie vragen heeft dan kunt u op werkdagen van 8:00-16:30 uur contact opnemen met een medewerker van de polikliniek Urologie, telefoonnummer (050) 361 21 67.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Wanneer u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, vragen wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met een medewerker van de polikliniek Urologie.

urologie.umcg.nl

Het (web)adres voor informatie over de afdeling Urologie van het UMCG.

Patiënteninformatie VLC488 / november 2019