

Beatrix Kinderziekenhuis | Functiecentrum
Poortweg 12 | 1e verdieping

McArdle test

Wij verwachten uw kind voor een McArdle test op het
Functiecentrum van het Beatrix Kinderziekenhuis.

Datum: _____

Tijdstip: _____

Broertjes en zusjes

Wij raden u aan **geen** andere kinderen mee te nemen naar het ziekenhuis. We hebben geen opvang voor hen en het is belangrijk dat u uw aandacht kunt richten op het kind dat het onderzoek ondergaat.

Vorbereidingen thuis

Stel uw kind gerust

Waarschijnlijk ziet uw kind tegen het onderzoek op. Dat is heel begrijpelijk. Bereid uw kind daarom op het onderzoek voor. Probeer hem of haar van tevoren wat gerust te stellen, zonder de zaken mooier voor te spiegelen dan ze zijn. Wat u daarbij kunt vertellen is erg afhankelijk van de leeftijd van uw kind. U kent uw kind beter dan wij, maar wij willen u graag helpen. Bel gerust als u vragen heeft.

Verdovende spray

Voor het verdoven van een prikplaats kan gebruik gemaakt worden van een verdovende spray die snel werkt.

Eten en drinken

Uw kind mag voor de test gewoon eten en drinken.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, mag uw kind deze op de normale tijd innemen, tenzij de arts dit anders met u heeft afgesproken.

Kleding

Laat uw kind gemakkelijke kleding dragen, liefst met korte of wijde mouw.

Meenemen

Het is verstandig om het volgende mee te nemen:

- iets om te eten en te drinken na afloop van het onderzoek.
- iets waarmee uw kind graag speelt, een knuffel, een boek, spelletje, MP3-speler of eventueel een DVD of spelletje voor de computer.

Laat uw kind makkelijke kleding dragen, liefst met korte mouw.

Ziekte

Bel ons als uw kind een paar dagen voor de afspraak ziek wordt.

We kunnen dan met u overleggen of de afspraak kan doorgaan of uitgesteld moet worden. Bel ons ook als uw kind in aanraking is geweest met een kind dat een besmettelijke (kinder)ziekte heeft, zoals waterpokken of kinkhoest.

Verloop van het onderzoek

Een verpleegkundige brengt u en uw kind naar de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. U kunt tijdens het onderzoek bij uw kind blijven; uw kind moet wel in bed blijven.

De verpleegkundige brengt een infuus in via een prik aan de binnenkant van de elleboog of bovenop de hand van uw kind. Het infuus blijft zitten zolang het onderzoek duurt. Uw kind heeft er weinig last van en kan zich gewoon bewegen. Alleen met de arm waarin het infuus zit, moet uw kind voorzichtig zijn.

De bloeddruk wordt gemeten. Daarna wordt gedurende twee minuten de band van de bloeddrukmeter opgepompt tot boven de eigen bloeddruk van uw kind. Hierdoor stroomt er minder bloed in de arm. Uw kind moet tijdens deze twee minuten in een balletje knijpen. Hoewel dit knijpen pijnlijk is, is het belangrijk hiermee door te gaan. Dit is een belangrijk onderdeel van de test.

De verpleegkundige neemt zowel voor als na het knijpen een aantal malen bloed af via het infuus. Hier voelt uw kind niets van. De laatste bloedafname is 60 minuten na het starten van het knijpen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt gemiddeld ongeveer anderhalf uur.

Na afloop

Als het onderzoek is afgerond, verwijdert de verpleegkundige het infuus. Dit doet geen pijn. De test heeft geen bijwerkingen.

Uitslag van het onderzoek

U krijgt na drie à vier weken telefonisch bericht over de uitslag. U ontvangt hiervoor een belafpraak.

Vragen

Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u op werkdagen contact opnemen met een medewerker van het Functiecentrum. Het telefoonnummer is (050) 361 27 06.