

Beatrix Kinderziekenhuis | Functiecentrum
Poortweg 12 | 1e verdieping

Vastencurve gecombineerd met een orale glucose tolerantie test (O.G.T.T.)

Stofwisselingsonderzoek

Wij verwachten uw kind voor een vastencurve gecombineerd met een O.G.T.T. op het Functiecentrum van het Beatrix Kinderziekenhuis op:

Datum: _____

Tijdstip: _____

Broertjes en zusjes

Wij raden u aan om **geen** andere kinderen mee te nemen naar het ziekenhuis. We hebben geen opvang voor hen en het is belangrijk dat u uw aandacht kunt richten op het kind dat het onderzoek ondergaat.

Vorbereidingen thuis

Stel uw kind gerust

Uw kind kan opzien tegen het onderzoek. Dat is begrijpelijk. Bereid uw kind daarom op het onderzoek voor. Probeer hem of haar van tevoren gerust te stellen. Dit kunt u doen door eerlijk te vertellen wat er gaat gebeuren. Wat u daarbij vertelt is erg afhankelijk van de leeftijd van uw kind. U kent uw kind beter dan wij, maar wij willen u daarbij graag helpen. Bel gerust als u vragen heeft.

Verdovende spray

Voor het verdoven van een prikplaats kan gebruik gemaakt worden van een verdovende spray die snel werkt.

Eten en drinken

De arts heeft een tijd met u afgesproken waarna uw kind niets meer mag eten. Uw kind mag alleen water en thee zonder suiker drinken. Iets anders niet.

Medicijnen

Uw kind mag eventuele medicijnen op de normale tijd met water innemen, tenzij de arts dit anders met u heeft afgesproken.

Ziekte

Bel ons als uw kind een paar dagen voor de afspraak ziek wordt. We kunnen dan met u overleggen of de afspraak door kan gaan of uitgesteld moet worden. Bel ons ook als uw kind in aanraking is gekomen met een kind dat een besmettelijke (kinder) ziekte heeft, zoals waterpokken of kinkhoest.

Kleding

Laat uw kind gemakkelijke kleding dragen, liefst met korte of wijde mouw.

Meenemen

Het onderzoek duurt in principe de hele dag. Het is handig het volgende mee te nemen:

- Een lievelingsknuffel, speen, wat speelgoed, boekjes, MP3-speler, video of dvd.
- Als uw kind gewend is uit een eigen beker of fles te drinken, is het handig om die mee te nemen.
- Als uw kind flesvoeding krijgt raden wij u aan om dit zelf mee te nemen.
- Eten voor u zelf en uw kind. Drinken is niet nodig.

Verloop van het onderzoek

Een verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer en brengt u en uw kind naar de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. Tijdens de vastencurve/o.g.t.t. moet de urine van uw kind bewaard blijven voor onderzoek. Dit betekent dat uw kind op de po of in een urinefles moet plassen. Baby's en kleine kinderen die nog niet zindelijk zijn, krijgen door de verpleegkundige een plaszakje

opgeplakt. Tijdens het onderzoek wordt regelmatig water of thee zonder suiker aangeboden om te drinken.

De verpleegkundige brengt een infuus in via een prik aan de binnenkant van de elleboog of bovenop de hand van uw kind. Het infuus blijft tijdens het onderzoek zitten. Met de arm waar het infuus inzit moet uw kind wat voorzichtig zijn. Maar verder kan uw kind gewoon bewegen en spelen.

De verpleegkundige neemt regelmatig bloed af via het infuus. Het bloedsuikergehalte wordt regelmatig gecontroleerd en als deze voldoende gedaald is krijgt uw kind van de verpleegkundige een suikerdrankje te drinken. Dit zal ongeveer aan het einde van de ochtend zijn. Ook daarna wordt regelmatig bloed afgenomen uit het infuus. Het bloedsuikergehalte bepaalt in zekere mate de duur van het onderzoek. Het onderzoek kan de hele dag duren, maar maximaal tot 16.30 uur.

Na afloop

Als uw kind goed gegeten en gedronken heeft, controleert de verpleegkundige nog eenmaal het bloedsuikergehalte bij uw kind. Als deze goed is wordt het infuus verwijderd door de verpleegkundige, dit doet geen pijn. Als uw kind een plaszakje heeft, wordt dit verwijderd.

Uitslag van het onderzoek

Tenzij de arts anders met u heeft afgesproken, maakt u tijdens het onderzoek bij de medische administratie een afspraak voor het telefonisch spreekuur over ongeveer twee maanden. Dan worden de uitslagen van het onderzoek met u besproken. De eerste uitslagen zijn na een paar weken bekend, maar die van de meer specifieke onderzoeken komen na ongeveer zes tot acht weken.

Vragen

Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u een medewerker van het Functiecentrum bellen. Het telefoonnummer is (050) 361 27 06.

