

Orale glucose tolerantie test

Wij verwachten uw kind voor een orale glucose tolerantie test op het Functiecentrum van het Beatrix Kinderziekenhuis.

Datum: _____

Tijdstip: _____

Broertjes en zusjes

Wij raden u aan om **geen** andere kinderen mee te nemen naar het ziekenhuis. We hebben geen opvang voor hen en het is belangrijk dat u uw aandacht kunt richten op het kind dat het onderzoek ondergaat.

Vorbereidingen thuis

Stel uw kind gerust

Waarschijnlijk ziet uw kind een beetje tegen het onderzoek op. Dat is heel begrijpelijk. Bereid uw kind daarom op het onderzoek voor. Probeer hem of haar van tevoren wat gerust te stellen, zonder de zaken mooier voor te spiegelen dan ze zijn. Wat u daarbij kunt vertellen is erg afhankelijk van de leeftijd van uw kind. U kent uw kind beter dan wij, maar wij willen u graag helpen. Belt u gerust als u nog vragen heeft.

Verdovende spray

Voor het verdoven van een prikplaats kan gebruik gemaakt worden van een verdovende spray die snel werkt.

Eten en drinken

Voor het onderzoek moet uw kind een lege maag hebben. Daarom mag uw kind de avond voor het onderzoek na 24.00 uur niets meer eten of drinken. Alleen bij erge dorst mag uw kind een klein beetje water hebben. Alleen water, geen thee of limonade.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, mag uw kind deze op de normale tijd innemen, tenzij de arts dit anders met u heeft afgesproken. De medicijnen mogen alleen met water worden ingenomen.

Ziekte

Bel ons als uw kind een paar dagen voor de afspraak ziek wordt. We kunnen dan met u overleggen of de afspraak door kan gaan of uitgesteld moet worden. Bel ons ook als uw kind in aanraking is geweest met een kind dat een besmettelijke (kinder)ziekte heeft, zoals waterpokken of kinkhoest.

Meenemen

Het is verstandig om het volgende mee te nemen:

- iets om te eten en te drinken na afloop van het onderzoek.
- iets waarmee uw kind graag speelt, een knuffel, een boek, spelletje, MP3-speler of eventueel een DVD of spelletje voor de computer.

Laat uw kind makkelijke kleding dragen, liefst met korte mouw.

Verloop van het onderzoek

Een verpleegkundige brengt u en uw kind naar de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. Daar brengt de verpleegkundige een infuus in via een prik aan de binnenkant van de elleboog of bovenop de hand van uw kind. Dit doet een beetje pijn. Het infuus blijft voor de duur van het onderzoek zitten. Uw kind heeft er weinig last van en kan zich gewoon bewegen. Alleen met de arm waar het infuus in zit, moet uw kind voorzichtig zijn.

Uw kind krijgt een suikeroplossing te drinken als teststof, die de hormoonproductie van het lichaam beïnvloedt. Voordat uw kind de teststof opdrinkt en ook een aantal malen daarna neemt de verpleegkundige via het infuus wat bloed af. Hier voelt uw kind niets van. De bloedmonsters gaan voor onderzoek naar het laboratorium.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer tweeënhalf uur.

Na afloop

Als het onderzoek is afgerond, verwijdert de verpleegkundige het infuus; dit doet geen pijn. Na de test kan uw kind zich wat slap voelen. Laat uw kind daarom voor het naar huis gaan eerst even iets eten en drinken. We maken met u een afspraak om de uitslag van het onderzoek te bespreken.

Vragen

Als u vragen heeft over het onderzoek kunt u bellen met een medewerker van het Functiecentrum. Het telefoonnummer is (050) 361 27 06.